


Enquête Démographique et de Santé 2012-2013

Planification familiale

Une femme malienne en union sur dix utilise une méthode moderne de contraception. Les méthodes les plus utilisées sont les injectables, la pilule et l'implant.


Utilisation des méthodes modernes *Pourcentage des femmes de 15-49 ans*



Mortalité maternelle

La mortalité des mères a sensiblement baissé depuis 2001. La mortalité maternelle est de 368 décès pour 100 000 naissances, contre 582 décès en 2001.

> Tendances de la mortalité maternelle Décès pour 100 000 naissances




Santé de la mère

La proportion de mères qui ont effectué au moins les quatre visites prénatales recommandées a légèrement augmenté depuis l'EDSM-III 2001.

Tendances de la santé maternelle

Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête qui ont effectué au moins 4 visites prénatales



2001 2012-2013* Excision

Neuf femmes de 15-49 ans sur dix (91%) et 69 % des filles de moins de 15 ans ont été excisées. C'est dans la région de Kayes que les proportions de femmes et de filles excisées sont les plus élevées.


Excision des femmes et des filles par région Pourcentage de femmes de 15-49 ans et


de filles de moins de 15 ans excisées Femmes Filles de moins de 15-49 ans de 15 ans 95 Kayes Koulikoro 74 91 Sikasso 67 89 Ségou 58 88 Mopti 65 Bamako 73

Paludisme

La grande majorite des ménages (84 %) possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII). C'est dans la région de Ségou que l'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes est la plus élevée.

Possession des MII





*Les trois régions du Nord et trois cercles de Mopti n'ont pas été enquêtés.







